

Tuần	Đặc điểm hình thái	Công việc chăm sóc	Ghi chú kỹ thuật
Tuần 1 (Ngày 1–7)	Hạt giống bắt đầu nảy mầm, tách vỏ, mầm trắng nhú ra. 2–3 ngày sau xuất hiện lá mầm.	Ủ ẩm ủ ẩm trong giấy ăn hoặc bầu gieo. Đặt bầu vào giá thể túi PE hai lớp. Tưới nước giữ ẩm nhẹ.	Nhiệt độ ủ ẩm 28–32°C. Chỉ tưới phun sương, tránh úng. Dùng đế kê (gạch hoặc nhựa) để tránh tiếp xúc
Tuần 2 (Ngày 8–14)	Cây ra 1–2 lá thật, rễ phát triển mạnh.	Chuyển bầu giá thể ra giàn. Tăng dần ánh sáng. Tưới phân loãng NPK 30–10–10 (1g/1L)	Đảm bảo ánh sáng $\geq 70\%$. Mật độ bầu: 1 cây/túi. Chỉ tưới buổi sáng sớm.
Tuần 3 (Ngày 15–21)	Cây đạt 3–4 lá thật, thân cứng cáp hơn.	Dựng cọc đỡ cây. Bổ sung phân vi lượng + NPK. Kiểm tra sâu bệnh (bọ trĩ, nấm gốc).	Cây chuẩn bị leo giàn nên cần định hướng dây sớm. Phun phòng nấm bằng chế phẩm sinh học
Tuần 4 (Ngày 22–28)	Cây phát triển mạnh, đạt 5–6 lá thật. Bắt đầu vươn dây bò.	Bắt đầu buộc dây leo giàn. Bổ sung phân hữu cơ hoai mục. Tưới nước sáng và chiều.	Dây leo cần được nâng đỡ nhẹ nhàng. Ánh sáng cần $> 80\%$.
Tuần 5 (Ngày 29–35)	Dây leo dài hơn 30cm, bắt đầu vắt lên giàn.	Cắt tỉa nhánh yếu. Bón phân NPK tăng lân và kali. Phun phòng sâu ăn lá bằng thảo mộc.	Cần tỉa lá không hiệu quả để dưỡng chất tập trung. Cảnh giác rệp sáp đầu mùa.
Tuần 6 (Ngày 36–42)	Cây đưa lưới phân nhánh, chuẩn bị thời kỳ ra hoa.	Bón phân ra hoa (6–30–30). Tăng cường ánh sáng buổi sáng. Tưới nhỏ giọt duy trì ẩm đều.	Phân bón nên chia làm 2 lần/tuần. Không tưới muộn sau 17h.
Tuần 7 (Ngày 43–49)	Xuất hiện hoa đực đầu tiên. Lá phát triển đồng đều.	Quan sát hoa đực nở. Ghi chú thời điểm. Bón thêm kali để chuẩn bị đậu trái.	Chỉ chọn hoa đực nở hoàn chỉnh để quan sát. Tăng ánh sáng buổi sáng.
Tuần 8 (Ngày 50–56)	Bắt đầu ra hoa cái, thời kỳ thụ phấn nhân tạo.	Thụ phấn nhân tạo vào buổi sáng. Bón phân hỗ trợ ra hoa và đậu trái. Giữ độ ẩm ổn định.	Thụ phấn vào khung 7h–9h sáng. Dùng bông hoặc tay nhẹ nhàng. Bảo vệ môi trường trong nhà lưới.
Tuần 9 (Ngày 57–63)	Chọn trái, cắt bỏ trái phụ, giữ 1 trái/cây.	Cắt bỏ trái không đạt. Buộc dây cố định trái. Tăng phân kali + canxi.	Chỉ giữ trái giữa thân. Buộc nhẹ bằng dây mềm. Duy trì phân bón đều.
Tuần 10 (Ngày 64–70)	Trái bắt đầu lớn nhanh, bằng quả chanh đến quả cam.	Kiểm tra phát triển trái. Tăng nước, giảm đạm. Tạo giàn đỡ trái.	Không để trái chạm đất. Giàn đỡ cần vững chắc. Theo dõi dị dạng vỏ.
Tuần 11 (Ngày 71–77)	Tiếp tục chăm sóc trái, bọc lưới chống côn trùng.	Bọc túi lưới từng trái. Tưới duy trì sáng sớm. Theo dõi dấu hiệu nứt vỏ.	Không dùng nước lạnh tưới trực tiếp. Giảm đạm hoàn toàn.

Tuần 12 (Ngày 78–84)	Củng cố giàn và điều chỉnh ánh sáng, tránh nứt trái.	Cắt lá che trái. Giảm tưới trước thu hoạch. Kiểm tra lưới vân trái.	Che trái đúng cách giúp lưới đều. Giảm tưới thúc chín tự nhiên.
Tuần 13 (Ngày 85–91)	Trái phát triển hoàn thiện, vân lưới rõ, chuẩn bị thu hoạch.	Dừng tưới 3–5 ngày trước thu. Thu hoạch trái đạt độ ngọt và vân lưới chuẩn.	Thu hoạch buổi sáng sớm. Trái đạt độ ngọt > 12 Brix. Dùng dao bén cắt cuống sát trái.